Obésité et rhumatologie

Jeudi 17 novembre 2016

Dr COLCOMBET Clémence , rhumatologue

Lésions ostéoarticulaires liées à l'obésité

l'épidémie de l'obésité :

Plusieurs problèmes en rhumatologie

• 1- l'arthrose :

- -arthrose mécanique
- -arthrose systémique
- -arthrose métabolique
-

• 2- les rhumatismes inflammatoires

-

• 3- la densité osseuse

ARTHROSE

Implication dans la gonarthrose +++ (TT>IMC)

Lors de la marche, l'articulation fémoro-tibiale doit supporter une force équivalente à **3 à 6 fois notre poids**

SURCHARGE PONDERALE

Augmentation du risque
d'apparition

Risque de
progression
radiographique et

Complications après mise en place d'une
prothèse

+ marquée chez la femme , post ménopausique (1,2)

1. Sharma L, Kapoor D, Issa S. [Epidemiology of osteoarthritis](#) : an update. [Curr Opin Rheumatol](#) 2006 ; 18 (2) :147-56.

2. Felson DT, Lawrence RC, Dieppe PA, et al. [Osteoarthritis](#) : new insights. Part 1 :the disease and its risk factors. [Ann Intern Med](#) 2000 ; 133 (8) : 635-46

OBESITE et PROTHESES

- **Complications globales** (IMC>40): 22% , vs 5 %

- **Descellements :**

- + fréquents

- + précoces

- **Survies : 72,3 % vs 97,6%** à 5 ans

- + d'infections et de complications cutanées

3 sur 6

from: Murray DW (32): Kaplan-Meier five-year survivorship curve using revision and pain as an end-point

COMPLICATIONS du geste chirurgical

- La technique est plus difficile
 - - temps opératoire + long
 - - voie d'abord + large
 - - risque de lésions de tissus péri-articulaires
 - - pertes sanguines + abondantes

OBESITE ET COXARTHROSE

Liens établis entre obésité et survenue d'une coxarthrose **mais moins marqués** ^(3,4)

Pas de rôle dans l'aggravation d'une coxarthrose établie ⁽³⁾

- Cliquez pour ajouter un

3. Hochberg MC. Risk factors for the development and progression of hip osteoarthritis. *J Rheumatol* 2005 ; 32 (6) :1135-6.

4. Lieveense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP, van Baar ME, Verhaar JA, Koes BW. Influence of obesity on the development of osteoarthritis of the hip : a systematic review. *Rheumatology (Oxford)* 2002 ; 41 (10) :1155-6

ARTHROSE

Normal

Arthrose

Contraintes mécaniques :

2 hypothèses

• MACROTRAUMATIQUE

• MECANORECEPTEURS

FACTEURS MECANIQUES

Activation des chondrocytes

Production de substances chondrolytiques

- métalloprotéases (MMP1, MMP3)
- NO, radicaux libres
- NfkB (pro-inflammatoire)

Dégradation du cartilage (5,6)

5. Wong M, Carter DR. Articular cartilage functional histomorphology and mechanobiology: a research perspective. Bone 2003 ; 33 (1) :1-13

6. Rannou F, Poiraudou S, Revel M. Cartilage :from biomechanics to physical therapy. Ann Readapt Med Phys 2001 ; 44 (5) : 259-67

Et dans l'arthrose digitale ?

- 0

Stress mécanique : c'est une cytokine

Obésité: FdR d'arthrose digitale

→ Rôle de facteurs systémiques dans l'arthrose ?

Facteurs systémiques

Obésité = augmentation de la prévalence ⁽⁷⁾

Rôle de facteurs systémiques dans la génèse de l'arthrose :

Les ADIPOKINES

ETAT PRO-INFLAMMATOIRE

- Cli

Tissu adipeux et inflammation

Le SWITCH des macrophages +++

Une augmentation du TA Augmentation de la proportion de macrophages CD68+ qui produisent du TNF

Obésité et réponse immunitaire

Tissu adipeux pas inerte
Etroitement associé avec le statut inflammatoire observé chez les individus obèses.

2 acteurs principaux

- *Les macrophages
- *Les adipocytes

Adipocytokines

- Adiponectine
- Leptine
- Resistine

CYTOKINES et ARTHROSE

- Cli

Figure 2 - Rôle de l'obésité dans l'expression des cytokines dans l'arthrose humaine.

Adipokines

LEPTINE : +++

- ↑ avec le TA
- Freine l'appétit
- Rôle pro-inflammatoire

- ↑ dans le liquide synovial et le cartilage des patients arthrosiques [IMC]

- Sécrétée par la membrane synoviale et la graisse sous rotulienne

- Injection IA (rat) ⁽⁸⁾

- → Induit la sécrétion de MMP-2 et 9 , stress oxydatif, TNF alpha, IL6

Adipokines

• Adiponectine :

- ↓ chez l'obèse
- Régulation de la sensibilité à l'insuline
- Anti-inflammatoire, favorable à l'endothélium vasculaire

• Chondroprotecteur

- avec effet inhibiteur des MMP , TNF alpha , NFkB et IL-1 ⁽⁹⁾.

- Faible concentration dans le liquide synovial des patients arthrosiques et PR ⁽¹⁰⁾

Adipokines

•Adiponectine :

- ↓ chez l'obèse
- Régulation de la sensibilité à l'insuline
- Anti-inflammatoire, favorable à l'endothélium vasculaire

•Chondroprotecteur

- avec effet inhibiteur des MMP , TNF alpha , NFkB et IL-1 ⁽⁹⁾.

- Faible concentration dans le liquide synovial des patients arthrosiques et PR ⁽¹⁰⁾

Arthrose métabolique : nouveau phénotype ?

=cumul de plusieurs troubles cliniques ou biologiques qui élèvent le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires ou un diabète de type 2.

Le syndrome métabolique est défini par l'association de:

Tour de taille élevé (obésité abdominale ou centrale)

- au dessus de 94 cm pour l'homme
- au dessus de 80 cm pour la femme

(critères de Fédération Internationale du Diabète, IDF 2005)

(Pour les USA, les chiffres sont: = 102 cm (H), = 88 cm (F). Ces chiffres ont longtemps été ceux retenus également en France.)

Et de 2 critères ou plus parmi :

- Hypertriglycémie: Taux > 1,50g/L (1,7 mmol/L) ou traitement spécifique
- **HDL-C bas** < 0,40g/L (1,03 mmol/L (H)) ou traitement spécifique
< 0,50g/L (1,29 mmol/L (F))
- **Pression artérielle élevée**> 130 mm Hg pour la systolique ou = 85 mm Hg pour la diastolique , ou HTA traitée
- **Anomalies de la glycémie**: à jeun = 1,00g/L(5,6 mmol/L)ou diabète de type 2 traité

Arthrose métabolique : nouveau phénotype ?

=cumul de plusieurs troubles cliniques ou biologiques qui élèvent le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires ou un diabète de type 2.

Le syndrome métabolique est défini par l'association de:

Tour de taille élevé (obésité abdominale ou centrale)

- au dessus de 94 cm pour l'homme
- au dessus de 80 cm pour la femme

(critères de Fédération Internationale du Diabète, IDF 2005)

(Pour les USA, les chiffres sont: = 102 cm (H), = 88 cm (F). Ces chiffres ont longtemps été ceux retenus également en France.)

Et de 2 critères ou plus parmi :

- Hypertriglycéridémie: Taux > 1,50g/L (1,7 mmol/L) ou traitement spécifique
- **HDL-C bas** < 0,40g/L (1,03 mmol/L (H)) ou traitement spécifique
< 0,50g/L (1,29 mmol/L (F))
- **Pression artérielle élevée**> 130 mm Hg pour la systolique ou = 85 mm Hg pour la diastolique , ou HTA traitée
- **Anomalies de la glycémie**: à jeun = 1,00g/L(5,6 mmol/L)ou diabète de type 2 traité

Cliquez pour ajouter un titre

NHANES III Data – General population

Risk Factor	Population without Osteoarthritis			Population with Osteoarthritis		
	Female n = 80 708 082	Male n = 76 702 913	Total n = 157 410 995	Female n = 10 703 824	Male n = 6 765 041	Total n = 17 468 865
High blood pressure	30.0	37.3 ^a	33.6	77.5	77.9	77.7 ^b
High fasting glucose	9.2	13.2 ^a	11.2	25.5	38.8 ^a	30.7 ^c
Low HDL-C	39.2	35.2	37.2	48.2	46.2	47.4
Elevated triglycerides	23.9	34.8 ^a	29.2	50.6	49.0	50.0 ^c
Abdominal obesity	43.1 ^d	26.1	34.8	73.2 ^d	56.8	66.9 ^e

Risque de gonarthrose selon la présence d'obésité et /ou Sd métabolique

	Avec gonarthrose Rx n(%)	Odds ratio (IC 95%), p
Non obèse sans paramètres « cardio-métaboliques » (n=212)	10 (4,7%)	Référence
Non obèse avec paramètres « cardio-métaboliques » (n=85)	5 (5,9%)	1,28 (0.43-3.87)
Obèse sans paramètres « cardio-métaboliques » (n=47)	6 (12,8%)	3.00 (1.03-8.71), p<0.05
Obèse avec paramètres « cardio-métaboliques » (n=138)	32 (23,2%)	6.2 (1.93-13.07), p<0.0001

Gonalgies plus fréquentes dans le groupe obésité avec paramètres « cardio-métaboliques » versus autres groupes

Quels liens avec le diabète ?

Homme > femme

Age avancé (exceptionnelle avant 40 ans ,
40% > 80ans

23 à 40% de diabétique +++

Le diabète de type 2 favorise t-il la survenue
de l'ossification ligamentaire?

Quels liens avec le diabète ?

Homme > femme

Age avancé (exceptionnelle avant 40 ans ,
40% > 80ans

23 à 40% de diabétique +++

Le diabète de type 2 favorise t-il la survenue
de l'ossification ligamentaire?

3 hypothèses ⁽¹³⁾

1- hyperinsulinisme : rôle ostéoformateur et calcifiant

2- hyperglycémie: rigidité des membranes , production de cytokines proinflammatoires , stimulation de la croissance ostéoblastique au n° des ligaments

3- Ischémie des enthèses : microangiopathie diabétique : transformation des fibroblastes en ostéoblastes

Effets de la perte de poids

Régime : RAS

Régime + exercices physiques : dim du womac
fonction

+ d'effet de perte de la masse grasse que perte
de poids global

Meilleur taux de survie des prothèses

OBESITE et RIC

Obésité et RIC: prévalence

- PR: 9 à 20% de malades obèses Pedersen et al. 2006

Crowson et al. 2013

Katz et al. 2013

- SpA: 13 à 30 % Eder et al. 2014 Bhole et al. 2012

Di Minno et al. 2013

- Rpso: 36% Gremese et al. 2014

Ottaviani et al. 2012

Augmentation de la prévalence de l'obésité chez les patients atteints de RIC

OBESITE et PR

OBESITE = Risque relatif augmenté surtout pour les PR ACPA –

Moins de destructions articulaires (14)

Moins bonne réponse thérapeutique des anti-TNF alpha (IFX+)

OBESITE et SPA

- + de syndesmophytes (forme ankylosante)
- + de femme et de SpA B27 neg
- Bonne réponse des anti-TNF (IFX++)
- + active (score de BASDAI/ BASFI)

-

OBESITE et Rhum. Pso

Obésité: FdR de psoriasis et de rhumatisme psoriasique (surtout androïde)

Perte de poids : diminution des symptômes ++

Obésité : difficulté pour obtenir la remission

Obésité et densité osseuse

Effet positif :

- l'obésité protège de l'ostéoporose ⁽¹⁶⁾

Un faible IMC est un fdr de fracture (surtout la hanche ++)

- IMC élevé : perte osseuse plus lente après la ménopause ⁽¹⁷⁾
- **L'effet protecteur du poids ne se manifeste que jusqu'à un certain seuil d'IMC : 25kg/m²**

16.- Thomas T, Burquera B. Is leptin the link between fat and bone mass ? J Bone Miner Res 2002 ; 17 :1563-9.

17- De Laet C, Kanis JA, Oden A, et al. Body mass index as a predictor of fracture risk : a meta-analysis. Osteoporos Int 2005 ; 16 :1330-8

Efficacité d'une perte de poids

Perte de 10% du poids = 6 à 7 X plus de chance d'obtenir la rémission sévère

Obésité et densité osseuse

Effet délétère : (publications récentes)

la graisse viscérale = quantité de
graisse dans la moelle osseuse fragilité
osseuse et risque fracturaire

Données complexes

Effet de l'obésité $\neq$ selon les sites et le sexe !

❖ femme: obésité = $\uparrow$ fractures du **tibia**, **diaphyse fémorale**, **extrémité sup. de l'humérus**

$\downarrow$ fractures poignet, hanche et bassin

❖ Homme: obésité = $\uparrow$ fractures de hanche

Contraintes mécaniques et complexité du TA

Effets de la perte de poids ⁽¹⁸⁾

- Augmentation des marqueurs de la résorption osseuse
 - Diminution rapide de la DMO
 - -3,3% du T-score au rachis lombaire
 - -7,8% du T-score au col fémoral
- A 9 mois d'un BY-PASS , malgré supplémentation vitamino-calcique

conclusions

- L'apparition et l'évolution défavorable de l'arthrose est associée à l'obésité (surtout pour la gonarthrose)
 - facteurs de contraintes: -surpoids
-mécanorécepteurs
 - facteurs systémiques : ADIPOKINES (leptine+++)
- RIC :
 - La prévalence de l'obésité est augmentée (rhum. Pso)
 - Mauvaise réponse thérapeutique (anti-TNF alpha)
- Ostéoporose
 - Complexe car études pour et contre un effet protecteur de l'obésité
 -
 -

Merci pour votre
attention